

TASKINE®

Ibuprofen

Description:

TASKINE® (Ibuprofen) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) possessing analgesic, anti-inflammatory and antipyretic activities and is effective in the relief of inflammatory and painful conditions.

Properties:

Ibuprofen is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and peak plasma concentrations occur about 1 to 2 hours after oral administration. Ibuprofen is 90 to 99% bound to plasma proteins, and has a plasma half-life of about 2 hours. It is rapidly excreted in the urine mainly as metabolites and their conjugates. About 1% is excreted in urine as unchanged Ibuprofen and about 14% as conjugated Ibuprofen.

Indications:

TASKINE® is used in the relief of mild to moderate pain and inflammation in conditions such as: Dysmenorrhea, menstrual pain, migraine headache including migraine headache associated symptoms of nausea, and sensitivity to light and sound.

TASKINE® is also provide fast and effective relief of non-migraine headaches, post-operative pain, toothache, backache, musculoskeletal and joint disorders such as ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis including juvenile chronic arthritis, peri-articular disorders such as bursitis and tenosynovitis and soft-tissue disorders such as sprains and strains.

TASKINE® is also used to reduce fever.

Dosage and administration:

Adult:

The recommended initial daily dosage of **TASKINE®** is 1200 - 1800 mg given in divided doses. Some patients can be maintained on 600 - 1200 mg daily. The total daily dose of **TASKINE®** should not exceed 2400 mg.

Children:

The recommended daily dose of **TASKINE®** is 20 mg/kg of body weight given in divided doses. But in juvenile rheumatoid arthritis the daily dose of **TASKINE®** may be increased to 40 mg/kg of body weight given also in divided doses, in severe cases.

Not recommended for children weighing less than 7 kg.

Elderly:

No special dosage modifications are required unless renal or hepatic function is impaired, in which case dosage should be assessed individually.

Contraindications:

- In common with other NSAIDs, Ibuprofen should not be given to patients with a history of or active peptic ulcer.
- Bronchospasm may be precipitated in patients suffering from or with previous history of bronchial asthma.
- Ibuprofen should not be given to patients in whom Aspirin and other NSAIDs induce the symptoms of asthma, rhinitis or urticaria.
- In patients with severe heart failure.

Precautions:

- Caution is required in patients with renal, hepatic or cardiac impairment since the use of NSAIDs may result in deterioration of renal function. The dose should be kept as low as possible and renal function should be monitored in these patients.
- Appropriate monitoring and advice are required for patients with a history of hypertension and/or mild to moderate congestive heart failure, and Ibuprofen should be given with care since edema has been reported.
- Patients with uncontrolled hypertension, congestive heart failure, ischemic heart disease, peripheral arterial disease, and/or cerebrovascular disease should only be treated with Ibuprofen after careful consideration. Similar consideration should be made before initiating longer-term treatment of patients with risk factors for cardiovascular events (e.g. hypertension, hyperlipidaemia, diabetes mellitus and smoking).

TASKINE®

Ibuprofène

Description:

TASKINE® (Ibuprofène) est un non-steroidal le drogue anti-incendiaire (AINSs) possédant l'analgésique, les activités anti-inflammatoires et antipyrétiques et est efficace dans le soulagement de de conditions incendiaires et pénibles.

Propriétés:

Ibuprofène est rapidement absorbé de l'étendue gastro-intestinale et des concentrations de plasma maximum arrive environ 1 à 2 heures après l'administration orale. Ibuprofène est 90 à 99% limite aux protéines de plasma, et a une demi-vie de plasma d'à peu près 2 heures. Il est rapidement excrété dans l'urine principalement comme métabolites et leur conjugué. Environ 1% est excrété dans l'urine comme Ibuprofène inchangé et environ 14% comme Ibuprofène conjugué.

Indications:

TASKINE® est utilisé dans le soulagement de doux pour modérer la douleur et l'inflammation dans les conditions comme: La dysménorrhée, la douleur de menstruation, le mal de tête de migraine y compris le mal de tête de migraine a associé des symptômes de nausée, et la sensibilité pour allumer et sembler.

TASKINE® est aussi fournit le soulagement rapide et efficace de maux de tête non-migraine, la douleur poste-opératif, le mal de dents, le mal aux reins, les désordres squeletto-musculaires et communs comme ankylosing spondylitis et la polyarthrite rhumatoïde y compris le juvénile arthrite chronique, les désordres peri-articulaires comme l'hygroma et désordres de tenosynovitis et doux-tissu comme les foulures et comme les tensions.

TASKINE® est aussi utilisé pour réduire la fièvre.

Dosage et Administration:

Adulte:

L'initiale le recommandée dosage quotidien de **TASKINE®** est 1200 - 1800 mg donné dans les doses divisées. Quelques malades peuvent être maintenus sur 600 – 1200 mg quotidiennement. Le total la dose quotidienne de **TASKINE®** ne devrait pas dépasser 2400 mg.

Enfants:

La dose quotidienne recommandée de **TASKINE®** est 20 mg/kg de poids de corps donné dans les doses divisées. Mais dans la polyarthrite rhumatoïde de juvénile la dose quotidienne de **TASKINE®** pourrait être augmenté à 40 mg/kg de poids de corps donné aussi dans les doses divisées, dans les cas sévères.

Pas recommandé pour les enfants pesant moins que 7 kg.

Personnes âgées:

Aucunes modifications spéciales de dosage sont exigées à moins que la fonction rénale ou hépatique altère, dans lequel reconnaît le dosage devrait être individuellement évalué.

Contre-indications:

- Dans commun avec autre AINSs, Ibuprofène ne devrait pas être donné aux malades avec une histoire de ou l'ulcère digestif actif.
- Bronchospasme pourrait être précipité dans les malades souffrant de ou avec l'histoire précédente d'asthme des bronches.
- Ibuprofène ne devrait pas être donné aux malades dans que l'Aspirine et autre AINSs induisent les symptômes d'asthme, rhinitis ou urticaire.
- Dans les malades avec l'échec de coeur sévère.

Précautions:

- La Prudence est exigée dans les malades avec les troubles rénaux, hépatiques ou cardiaques puisque l'usage de AINSs peut avoir pour résultat la détérioration de fonction rénale. La dose devrait être gardée comme le niveau bas comme la fonction possible et rénale devrait être contrôlée dans ces malades.
- S'Approprier l'interception et le conseil est exigé pour les malades avec une histoire de et/ou d'hypertension doux pour modérer l'échec de coeur congestif, et Ibuprofène devrait être donné avec soin puisque l'œdème a été rapporté. Les malades avec l'hypertension non contenue, l'échec de coeur congestif, la maladie de coeur ischémique, la maladie artérielle périphérique, et/ou la maladie vasculaire cérébrale devrait être seulement traitée avec Ibuprofène après la considération prudente.
- La considération similaire devrait être faite avant d'inaugurer le traitement le plus à long terme de malades avec les facteurs de risque pour les événements cardio-vasculaires (par exemple l'hypertension, hyperlipidaemia, mellitus de diabète et fumeur).

تسکین®

ایبوبروفین

الوصف:

تسکین® (ایبوبروفین) هو عقار لاستيرويدي مضاد للإلتهاب، يتصف بنشاط مسكن، مضاد للإلتهاب وخافض للحرارة و هو فعال في علاج حالات الإلتهاب والأم.

الخواص:

يتم امتصاص ایبوبروفین بشكل سريع من الجهاز الهضمي، ويصل تركيزه إلى الذروة في البلازما بعد ساعة إلى ساعتين عن تناوله عن طريق الفم. يرتبط ایبوبروفین بروتینات البلازما بنسبة ٩٠ - ٩٩٪، ويبلغ نصف حوالی ساعتين. يطرَح بشكل سريع عن طريق البول غالباً على شكل مستقلبات ومستقلبات متفرقة ١٪ تقريباً تَطرح عن طريق البول على شكل ایبوبروفین غير متحول و ١٤٪ تقريباً على شكل ایبوبروفین مقترن.

دواعي الاستعمال:

يستعمل تسکین® لعلاج الألم الخفيف والمتوسّط وعلاج الإلتهاب في حالات مثل: عسر الطمث، ألم الطمث، صداع الشقيقة المتضمن صداع الشقيقة المرتبط بعلامات الغثاين والحساسية للضوء والصوت.

يعطى تسکین® أيضاً مفعولاً سريع وفعال في علاج الصداع غير المرتبط بشقيقة، الألم ما بعد العمليات الجراحية، ألم الأسنان، ألم الظهر، اضطرابات الجهاز العضلي العصبلي والمفاصل مثل الإلتهاب العفاري الحسي والإلتهاب المفصل الرثائي والمتضمنة الإلتهاب المفصل المزمن للأطفال، اضطرابات حول المفصل مثل الإلتهاب الكليسي الرثالي، الإلتهاب غمد الوتر، وإختلالات في الأنسجة اللينة مثل لي وإعياء المفصل.

يستعمل تسکین® أيضاً كخافض للحرارة.

الجرعات وطريقة الإستعمال:

البالغين:

تبلغ جرعة تسکین® اليومية الإبتدائية الموصى بها ١٢٠٠ - ١٨٠٠ ملغم، تعطى على شكل جرعات مقسمة. يستمر بعض المرضى بجرعة ٦٠٠ – ١٢٠٠ ملغم يومياً. يجب أن لا تتجاوز جرعة تسکین® اليومية عن ٢٤٠٠ ملغم.

الأطفال:

تبلغ جرعة تسکین® اليومية الموصى بها للأطفال ٢٠ ملغم/كغم من وزن الجسم، تعطى على شكل جرعات مقسمة. يمكن زيادة الجرعة إلى ٤٠ ملغم/كغم من وزن الجسم للأطفال المصابين بالإلتهاب المفصل الرثائي وتعطى أيضاً على شكل جرعات مقسمة، في الحالات الشديدة. لا يوصى باستخدامه في الأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٧ كغم.

كبار السن:

لا يلزم إجراء أي تعديلات للمرضى المسنين إلا إذا كانوا يعانون من ضعف في وظيفة الكلية أو الكبد، وفي هذه الحالة يجب تقدير الجرعة كلاً على حده.

مواعيل الإستعمال:

كما هي الحال مع مضادات الإلتهاب لاستيرويديّة الأخرى، فلا يعطى ایبوبروفین للمرضى الذين لديهم تاريخ مسبق للإصابة أو الذين أصيبوا بقرحة معدية نشطة.

- قد يربس الدواء التقلص الشعبي لدى المرضى الذين يعانون من أو لديهم تاريخ مرضي مسبق للإصابة بالربو الشعبي.

- لا يجوز إعطاء ایبوبروفین للمرضى الذين يسبب لهم الأسبيرين والأدوية لاستيرويدي مضادة للإلتهاب الأخرى أعراض الشرى، الإلتهاب الأنف أو الشرى. في المرضى الذين يعانون من قصور قلبي شديد.

محاذير الإستعمال:

- يجب توخي الحيلة والحذر في المرضى الذين يعانون من قصور في الكلى، الكبد أو القلب لأن إستعمال مضادات الإلتهاب لاستيرويديّة قد تسبب تدهور في الوظائف الكلوية. يجب المحافظة على إستعمال أقل جرعة ممكنة ومراقبة الوظائف الكلوية لدى هؤلاء المرضى.
- يلزم إجراء مراقبة ملائمة ونصح المرضى الذين يعانون من تاريخ مسبق للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأ/أو قصور قلبي إحتقاني خفيف إلى متوسط الحدة، ويجب إعطاء ایبوبروفین بحذر لأن إحتباس السوائل والخزب الوعائي تم تسجيله.
- يجب إستعمال ایبوبروفین في العلاج بحذر شديد للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، قصور قلب إحتقاني، مرض قلبي إقفاري، مرض شرياني طرفي، وأ/أو مرض وعائي نخاعي. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً قبل البدء بالعلاج طويل الأمد للمرضى الذين يعانون من احتمالية الإصابة بأحداث قلبية وعائية (مثل، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الدهون، داء السكري والتدخين).

Use during pregnancy and lactation:

Pregnancy category **B / D** (3rd trimester)

Pregnancy: Whilst no teratogenic effects have been demonstrated in animal toxicity studies, the use of Ibuprofen during pregnancy should, if possible, be avoided.

Lactation: Ibuprofen appears in the breast milk in very low concentrations and is unlikely to adversely affect the breast-fed infant.

Drug Interactions:

Care should be taken in patients treated with any of the following drugs:

- **Antihypertensives:** Reduced antihypertensive effect.

- **Diuretics:** Reduced diuretic effect. Diuretics can increase the risk of nephrotoxicity of NSAIDs.

- **Cardiac glycosides:** NSAIDs may exacerbate cardiac failure, reduce GFR and increase plasma cardiac glycoside levels.

- **Lithium:** Decreased elimination of Lithium.

- **Methotrexate:** Decreased elimination of Methotrexate.

- **Cyclosporin:** Increased risk of nephrotoxicity with NSAIDs.

- **Mifepristone:** NSAIDs should not be used for 8 - 12 days after Mifepristone administration as NSAIDs can reduce the effects of Mifepristone.

- **Other analgesics:** Avoid concomitant use of two or more NSAIDs.

- **Corticosteroids:** Increased risk of gastrointestinal bleeding.

- **Anticoagulants:** Enhanced anticoagulant effect.

- **Quinolone antibiotics:** Patients taking NSAIDs and quinolones may have an increased risk of developing convulsions.

Side effects:

Side effects reported include dyspepsia, gastrointestinal intolerance and bleeding, skin rashes of various types, and less frequently thrombocytopenia has occurred.

If abdominal pain, blood in the vomit or bloody or black stools, heartburn, nausea or vomiting, bloating, diarrhoea or constipation, ringing or buzzing in the ears, nervousness, sleeplessness, dizziness, any change in vision, fluid retention, itching, skin rashes or any other side effect or unexplained symptom develops while taking Ibuprofen, discontinue use immediately and contact a physician. If pain worsens or continues for more than 48 hours or new or unexpected symptoms or stomach pain occurs, consult the physician.

Overdosage:

Symptoms: Include nausea, vomiting, dizziness and rarely, loss of consciousness. Large overdoses are generally well tolerated.

Treatment: Consists of gastric lavage and, if necessary, correction of serum electrolytes and appropriate supportive measures. There is no specific antidote to Ibuprofen.

Storage conditions:

TASKINE® 200: Store at temperature not exceeding 25°C.

TASKINE® 400 & 600: Store at temperature not exceeding 30°C.

Presentation:

TASKINE® 200: Each soft gelatin capsule contains Ibuprofen 200 mg in packs of 30 softgels.

TASKINE® 400: Each film coated tablet contains Ibuprofen 400 mg in packs of 30 tablets.

TASKINE® 600: Each film coated tablet contains Ibuprofen 600 mg in packs of 30 tablets.

Hospital packs are also available.

This is a medicament • Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. • Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. • The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks. • Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. • Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. • Keep medicament out of the reach of children.	COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS UNION OF ARAB PHARMACISTS
---	--

The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordan

Grossesse et Allaitement:

Le B de catégorie de grossesse /D (le troisième trimestre)

Grossesse: Pendant qu'aucuns effets de teratogenic ont été démontrés dans les études de toxicité animales, l'usage d'Ibuprofène pendant la grossesse doit, si possible, être évité.

Lactation: Ibuprofène apparaît dans le lait de sein dans les concentrations très basses et est peu probable défavorablement d'affecter l'allaité le bébé.

Interactions médicamenteuses:

Le soin devrait être reçu des malades traités avec n'importe quel des drogues suivants:

- **Antihypertensives:** L'effet réduit d'antihypertensive.

- **Diurétiques:** L'effet diurétique réduit. Les diurétiques peuvent augmenter le risque de nephrotoxicity de AINSs.

- **Glycosides Cardiaque:** AINSs peut aggraver l'échec cardiaque, réduire le plasma de GFR et augmentation niveaux de glycoside cardiaques.

- **Lithium:** L'élimination diminuée de Lithium.

- **Methotrexate:** L'élimination diminuée de Methotrexate.

- **Cyclosporin:** Le risque augmenté de nephrotoxicity avec AINSs.

- **Mifepristone:** AINSs ne devrait pas être utilisé pour 8 - 12 jours après l'administration de Mifepristone comme AINSs peut réduire les effets de Mifepristone.

- **Autres analgésiques:** Eviter l'usage concomitant de deux ou plus de AINSs.

- **Corticoides:** Le risque augmenté de saignement gastro-intestinal.

- **Anticoagulants:** L'effet anticoagulant amoitié.

- **Quinolone antibiotiques:** Les malades prenant AINSs et quinolones peut avoir un risque augmenté de convulsions en voie de développement.

Effets indésirables:

Les effets secondaires rapportés incluent la dyspepsie, l'intolérance et le saignement gastro-intestinaux, les éruption de peau de divers types, et moins fréquemment thrombocytopenia est arrivé.

Si la douleur abdominale, le sang dans le vomit ou les tabourets sanglants ou noirs, la brûlure d'estomac, la nausée ou le vomissement, boursoufflement, la diarrhée ou la constipation, sonnant ou le bourdonnement dans les oreilles, la nervosité, l'insomnie, le vertige, n'importe quel changement dans la vision, la rétention fluide, démanger, l'éruption de peau ou aucun autre effet secondaire ou le symptôme inexpliqué développe pendant que prenant Ibuprofène, interrompre l'usage et contacter tout de suite un médecin. Si la douleur empiric ou continue pour plus de 48 heures ou nouvel ou imprévu les symptômes ou la douleur d'estomac arrive, consultez le médecin.

Surdosage:

Symptômes: Inclure la nausée, vomir, le vertige et rarement, la perte de conscience. Les grandes overdoses bien sont généralement tolérées.

Traitement: Consiste en lavage gastrique et, si nécessaire, la correction d'électrolytes de sérum et appropriée des mesures qui soutiennent. Il n'y a pas d'antidote spécifique à Ibuprofène.

Storage conditions:

TASKINE® 200: Conserver à une température inférieure à 25°C.

TASKINE® 400 & 600: Conserver à une température inférieure à 30°C.

Presentation:

TASKINE® 200: Chaque gélule molle contient 200 mg d'Ibuprofène dans des boîtes de 30 gélules molles.

TASKINE® 400: Chaque comprimé pelliculé contient 400 mg d'Ibuprofène dans des boîtes de 30 comprimés.

TASKINE® 600: Chaque comprimé pelliculé contient 600 mg d'Ibuprofène dans des boîtes de 30 comprimés.

Emballages hospitaliers sont aussi disponibles.

Ceci est un médicament • Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger. • Suivre strictement la prescription de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament. • Le médecin et le pharmacien sont des experts en médicament, ses avantages et ses risques. • Ne pas interrompre la période du traitement prescrit de votre initiative sans consulter votre médecin. • Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin. • Garder le médicament hors de la portée des enfants.	LE CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ L'UNION DES PHARMACIENS ARABES
---	--

The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordanie

الإستعمال خلال فترتي الحمل والإرضاع: فئة الحمل ب / د (في الثلث الثالث من الحمل) الحمل: في حين أنه لا توجد أدلة على حدوث تشوهات خلقية للجنّة في التجارب التي أجريت على الحيوانات، فإنه يجب تجنب إستعمال إيبوبروفين أثناء فترة الحمل عند الإمكانية. الإرضاع: يظهر إيبوبروفين في حليب الأم بتركيز قليلة جداً ومن غير المتوقع أن تؤثر على المولود الرضيع تأثيراً سلبياً. التداخلات الدوائية: يجب توخي الحذر لدى المرضى الذين تمّ علاجهم بإحدى الأدوية التالية: - خافضات ضغط الدم: يقلل من تأثير خافضات ضغط الدم. - مدرات البول: يقلل من تأثير مدرات البول. قد تزيد مدرات البول من سمية مضادات التهاب لاسيترويدية على الكلى. - الجليكوسيدات القلبية: قد تفاقم مضادات التهاب لاسيترويدية من الضصور القلبي، قلة التصفية الكلوية وزيادة في مستويات الجليكوسيدات القلبية في البلازما. - ليثيوم: يقلل من طرح الليثيوم. - ميثوتريكسات: يقلل من طرح ميثوتريكسات. - سايفلوسبورين: يزيد من احتمالية حدوث سمية في الكلى مع مضادات التهاب لاسيترويدية. - ميفيبريستون: يجب عدم إستعمال مضادات التهاب لاسيترويدية لمدة ٨ - ١٢ يوم بعد تناول ميفيبريستون لأن مضادات التهاب لاسيترويدية قد تقلل من تأثير ميفيبريستون. - المسكنات الأخرى: تجنب الإستعمال المتزامن لأثنين أو أكثر من مضادات التهاب لاسيترويدية. - كورتيكوستيرويدات: يزيد من احتمالية حدوث النزف من القادة الهمضية. - مضادات التخثر: يحسن من التأثير المضاد للتخثر. - المضادات الحيوية من مجموعة الكينولات: المرضى الذين يتناولون مضادات التهاب لاسيترويدية مع المضادات الحيوية من مجموعة الكينولات قد يزيد من احتمالية تطور الاختلاجات. الأعراض الجانبية: إن الأعراض الجانبية التي تلك رصدها تتضمن عسر الهضم، عدم التحمل في الجهاز الهضمي ومطغ جلدي نازف، بأنواع مختلفة وبشكل أقل تكراراً حدث زيادة في الصفيفحات المومية. إذا حدث ألم في البطن، دم في القيء أو براز دموي أو أسود، حرقة الفؤاد، غثيان أو قيء، تقيؤ، إسهال أو إمساك، طفنين أو آزيز في الأن، عصبية، نعلس، دوار، أي تغير في الرؤية، إحتباس في السوائل، حكة، مطغ جلدي أو أي أعراض جانبية أخرى أو أعراض غير مبررة تتطور خلال تناول إيبوبروفين، يجب التوقف عن إستعمال مباشرة والاتصال بالمطبيب. إذا حدث تدهور في الألم أو إستمر لأكثر من ٨ ساعة أو حدثت أعراض جديدة أو غير متوقعة أو ألم في المعدة، فإنه يجب إستشارة الطبيب. فرط الجرعة: الاعراض: تتضمن غثيان، قيء، دوار ونادرأ فقدان الوعي. في الموعوم، إن فرط الجرعة واسع النطاق جيد التحمل. العلاج: يتضمن غسل المعدة، وتصحيح الإلكتروليتات في المصل إذا دعت الحاجة وإجراءات داعمة مناسبة. لا يوجد ترياق محدد لفرط جرعة إيبوبروفين. ظروف الخطر: • تسكين® ٢٠٠: يحفظ بدرجة حرارة لا تزيد عن ٢٥°م • تسكين® ٤٠٠، ٦٠٠: يحفظ بدرجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م كيفية الترتيد: • تسكين® ٢٠٠: كل كبسولة جيلاتينية طرية تحتوي على إيبوبروفين ٢٠٠ ملغم في عبوات سعة ٣٠ كبسولة جيلاتينية طرية. • تسكين® ٤٠٠: كل قرص مغلف يحتوي على إيبوبروفين ٤٠٠ ملغم في عبوات سعة ٣٠ قرصاً. • تسكين® ٦٠٠: كل قرص مغلف يحتوي على إيبوبروفين ٦٠٠ ملغم في عبوات سعة ٣٠ قرصاً. عبوات مستشفيات متوفرة أيضاً.	إن هذا دواء • الدواء مستحضر يؤثر على صحتكم واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضكم للخطر. • إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. • إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغي وضرره. • لا تتلق مدة العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك. • لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية. • إخط الدواء بعيدا عن متناول الأطفال. مجلس وزراء الصحة العرب إتحاد الصيدالة العرب
--	---

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ذ.م.ج
ص.ب ٦٩ عمان ١١٥٩١ الأردن